

Estructura comunitaria y diversidad de peces en el Río Uruguay

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de
celulosa UPM S.A.

Abril, 2018



Autores:

Anahí López-Rodríguez
Iván González-Bergonzoni
Samanta Stebniki
Nicolás Vidal
Franco Teixeira de Mello
Alejandro D'Anatro

Colaboradores:

Joaquín Pais
Ivana Silva
Giancarlo Tesitore

Distribución: UPM S.A., DINAMA, DINARA

UPM S.A.

Estructura comunitaria y diversidad de peces en el Río Uruguay

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de
celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

Informe realizado en el marco de la asesoría técnica para el monitoreo de la comunidad de peces en las zonas de Nuevo Berlín, Fray Bentos y Las Cañas (Departamento de Río Negro, Uruguay) a pedido de UPM S.A.

El presente informe refleja la opinión de los autores y no es de carácter institucional.

Páginas: 51

Figuras: 10

Tablas: 4

Apéndices: 4

Imagen de tapa: individuos de las especies *Galeocharax humeralis* (izquierda) y *Cynopotamus argenteus* (derecha).

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	4
METODOLOGÍA	6
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA Y EFLUENTES	6
PERÍODOS Y ÁREA DE ESTUDIO	8
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS	10
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	12
PERÍODO 2005-2018	12
PERÍODO ABRIL 2018	18
CONDICIÓN DE LA ESPECIE INDICADORA	29
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	33
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
APÉNDICES	39

INTRODUCCIÓN

La planta de pasta de celulosa UPM S.A. localizada en Fray Bentos inició su producción a principios de Noviembre de 2007 y ha estado en operación desde entonces. El actual estudio sobre estructura comunitaria y diversidad específica de peces forma parte del monitoreo ambiental que UPM S.A. lleva a cabo de forma anual y sin interrupciones desde el año 2007. El presente programa y protocolo de monitoreo estandarizado ha sido aprobado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y se realiza en tres zonas del río Uruguay bajo: Nuevo Berlín, sitio considerado como zona de referencia, ya que está ubicado aproximadamente 24 Km aguas arriba del sitio de descarga de los efluentes de la planta de UPM S.A.; Fray Bentos, catalogada como zona receptora inmediata, por estar localizado inmediatamente aguas abajo de la zona de descarga de efluentes; y Las Cañas, siendo una zona receptora lejana, localizada aproximadamente 15 Km aguas abajo de la descarga de efluentes. Este programa de monitoreo se lleva a cabo en las mismas áreas y usando similar metodología a los estudios de línea de base realizados entre los años 2005-2007, también a cargo de la empresa UPM S.A. y anterior a la puesta en funcionamiento de la planta (Tana, 2007). Esta aproximación metodológica permite estudiar el potencial efecto de los efluentes de la planta sobre la comunidad de peces, comparando parámetros descriptivos de la estructura comunitaria antes y después de la puesta en marcha de la misma, y también entre la zona referencia y las zonas receptoras del efluente. Esta aproximación metodológica se denomina BACI (por sus siglas en inglés “*Before After Control Impact*”) y es una de las aproximaciones más adecuadas para este tipo de estudios de monitoreo de impacto ambiental a nivel mundial (Underwood, 1991).

Los estudios previos a la puesta en funcionamiento de la planta de UPM S.A. han revelado que la estructura comunitaria y diversidad de peces son relativamente similares entre estas tres áreas, aunque existe, en promedio, un menor número de especies de peces en la zona receptora lejana, i.e. Las Cañas (Tana, 2007). Durante los estudios de línea de base también se ha constatado la alta variabilidad temporal natural en la estructura de la comunidad de peces, pero siempre existiendo gran similitud en la composición específica --en cuanto a las especies dominantes-- entre los tres sitios de muestreo (Tana, 2007). Durante los monitoreos posteriores a los estudios de línea de base realizados a partir de Diciembre de 2007, se ha observado también la existencia de una gran variabilidad temporal en la estructura comunitaria de los peces, pero sin existir grandes diferencias en la abundancia, biomasa y diversidad específica total entre la zona de referencia y las dos zonas receptoras de efluentes. Estos resultados indicarían que la variabilidad en la comunidad de peces

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Igua 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-

Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

podría estar influenciada por otros factores ambientales independientes de las actividades de la planta de UPM S.A. No se han constatado diferencias sistemáticas en la condición de los individuos de la especie indicadora entre las tres zonas (e.g., factor de condición e índices hepato- y gonadosomático) (Tana, 2007, 2014, López-Rodríguez *et al.*, 2017a). En conjunto los trabajos previos de monitoreo no han indicado impactos de los efluentes sobre la estructura de la comunidad y diversidad de peces ya que no se han encontrado diferencias entre las zonas receptoras de efluentes (Fray Bentos y Las Cañas) y la zona referencia o control (Nuevo Berlín) (Tana, 2014, González-Bergonzoni *et al.* 2016a y referencias allí presentes).

Estos estudios de monitoreo, tanto los de línea de base, como los posteriores a la puesta en marcha de la planta, han sido diseñados de acuerdo a las regulaciones gubernamentales del “Canadian EEM” (por sus siglas en inglés: “*Environmental Effects Monitoring*”) en Canadá. Este programa se basa en la experiencia de estudios científicos de muchos años de monitoreo de impacto de efluentes de plantas de celulosa (información disponible en: <http://laws-lois.justice.gc.ca>). De acuerdo a este programa, se deben monitorear a nivel poblacional indicadores de reproducción, condición y supervivencia de peces expuestos a efluentes comparándolos con peces de zonas de referencia donde el efluente no está presente, en este caso, el área de Nuevo Berlín. Cambios en estos indicadores pueden ocurrir con anterioridad a la extinción local de una especie, aunque los cambios observados a nivel comunitario no siempre se correspondan con estos indicadores (EEM, 2010). En el período previo a la puesta en marcha de la planta es muy importante generar información de línea de base para ser utilizada como referencia en futuros monitoreos. Idealmente se sugiere enfocarse en dos especies locales y de movimiento restringido, utilizándose como “especies modelo” sobre las cuales monitorear indicadores de reproducción y condición general, comparando zonas de referencia con zonas expuestas, y también antes y después de la presencia de efluente en una misma zona siguiendo la antes mencionada metodología BACI (EEM, 2010; Underwood, 1991). Los estudios de línea de base, así como los estudios previos, han sugerido que la mejor especie “modelo” a utilizar en este sistema es el bagre trompudo, *Iheringichthys labrosus*, debido a su alta frecuencia de ocurrencia en los tres sitios de muestreo y abundancia en todos los muestreos, así como gran representación de diversas clases de talla, a su probable carácter local y a que posee hábitos alimenticios bentívoros. Además existen diferencias alimenticias y fisiológicas entre estas tres áreas (Masdeu *et al.*, 2011; D’Anatro *et al.*, 2013, respectivamente), que confirmaría el carácter local de la especie al menos en determinados períodos. Sin embargo, no existen estudios detallados sobre migraciones entre las tres

áreas de estudio (véase como excepción Calvelo *et al.*, 2013). No obstante, sí existe evidencia de migraciones locales (i.e. de corta distancia) de esta especie con fines reproductivos desde el Río Paraná hacia pequeños arroyos afluentes (Vazzoler, 1996; Holzbach *et al.*, 2009), lo que podría apoyar la posible migración entre las tres zonas de estudio.

En las diferentes áreas donde se llevó a cabo el estudio, los ambientes del río Uruguay se pueden dividir a gran escala entre: i) la zona litoral, entre 1-2 m de profundidad y localizada en la zona costera (<100 m), ii) la zona media, con profundidad de 2-5 m extendiéndose hasta aproximadamente 500 m de la línea costera, y finalmente iii) la zona profunda en el canal principal, con profundidades mayores a 8 m. Esta zonación ha sido también utilizada previamente en estudios de plancton y fauna bentónica (CELA, 2006).

El presente informe se enfoca en el monitoreo de la estructura de la comunidad de peces en las zonas litoral y media del río Uruguay, considerando un área de referencia (Nuevo Berlín) y dos áreas receptoras de efluente de UPM S.A. (Fray Bentos y Las Cañas), llevado a cabo entre los meses de abril-mayo de 2018 (entre los días 28 de abril y 3 de mayo). Este monitoreo se realiza en forma conjunta y complementaria al monitoreo de calidad de agua y de exposición de moluscos y peces a contaminantes, realizado en los mismos sitios y durante los mismos períodos a cargo de UPM S.A. (e.g. Tana, 2014; López-Rodríguez *et al.*, 2017c).

METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA Y EFLUENTES

La planta

La planta de celulosa de UPM S.A. está ubicada 5 km aguas arriba de la ciudad de Fray Bentos y posee una capacidad de producción anual de 1,3 millones de toneladas de pulpa de celulosa kraft blanqueada de *Eucalyptus spp.* La planta aplica las mejores técnicas disponibles (denominada planta “BAT”, por sus siglas en inglés: “Best Available Techniques”) como ha sido presentado en el reporte preparado por la comisión europea (Anon, 2001). Los troncos son descortezados en las plantaciones al cosecharlos y son chipeados en la planta. El proceso de cocción aplica la tecnología Lo-Solids®, en un digestor continuo de 3200 m³. El proceso de deslignificación continúa por medio de un tratamiento en dos etapas con oxígeno. Posteriormente, la pulpa es blanqueada usando una secuencia

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D’Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Igua 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

ECF "light" (A/D EOP D P) en la cual los principales agentes blanqueadores usados son el dióxido de cloro, hidróxido de sodio (y/o licor blanco oxidado), ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno. Este proceso ha sido diseñado para obtener un producto final con blancura de 89-92% ISO. La pulpa se seca en dos líneas paralelas iguales y luego de embalada es transportada por vía fluvial hasta el puerto de Nueva Palmira, c.a. 100 Km aguas abajo en el Río Uruguay, desde donde es exportada a papeleras en otros continentes.

La línea de recuperación consiste en una planta de evaporación de siete efectos con unidades evaporadoras de película descendente, una caldera de recuperación de 4.450 toneladas de sólidos secos por día, y una línea recaustificadora para producir el licor blanco usado en la cocción de los chips de madera. Los gases olorosos generados se recolectan y se queman en la caldera de recuperación; dos calderas de respaldo están instaladas para quemar esos gases en el caso de ocurrir perturbaciones en la operativa normal.

El agua bruta es tomada del Río Uruguay a una tasa promedio de 900 L/s y se trata para su uso en el proceso de forma similar a una planta de tratamiento de agua convencional. El efluente es vertido al Río Uruguay por medio de un difusor de 200 m, a una tasa promedio de 700 L/s. La planta de tratamiento del efluente consiste en un tratamiento primario (sedimentación) seguido de un tratamiento de lodos activados (tratamiento biológico). Luego del tratamiento primario, el efluente se dirige a un sistema de piletas de seguridad y ecualización, con un volumen de 75.000 m³, diseñado y operado para la prevención de anomalías en la calidad del efluente que se envía al tratamiento biológico. El sistema de lodos activados posee un volumen de 150.000 m³, en dos líneas, con un tiempo de residencia hidráulica de aproximadamente 48 horas. El promedio anual de flujo del efluente en el 2018 previo al monitoreo fue de 19,0 m³/ADT (tonelada de pulpa seca, ADT por sus siglas en inglés: "*Air-Dried Ton of pulp*"). Durante el presente período de estudio en abril de 2018 (datos entre 28 de abril y 3 de mayo) el flujo diario fue de 18,5 m³/ADT.

Calidad del efluente

Las características físico-químicas del efluente tratado durante el presente período de estudio se presentan en la Tabla 1. La tabla describe los valores promedios para el primer cuatrimestre del 2018 (enero-abril), así como para el último período de muestreo (28 de abril-3 de mayo de 2018). En la tabla se incluyen los valores límites aceptados en las tecnologías BAT de acuerdo a la comisión

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

europea (Anon, 2001). Tanto durante el presente período de monitoreo como durante el primer cuatrimestre de 2018 hasta la fecha del muestreo, los valores descargados al río nunca excedieron los valores permitidos de acuerdo a la normativa vigente.

Tabla 1. Características del efluente descargado de la planta de UPM S.A. en Fray Bentos. La tabla incluye valores promedios de descarga expresados en kilogramos por cada tonelada seca de pulpa producida (kg/ADT) para enero-abril 2018, así como, durante el período de muestreo (28 de abril-3 de mayo de 2018) y los valores límites permitidos por la comisión europea.

Kg / ADT	COD (Kg/ADT)*	BOD ₅ (Kg/ADT)	AOX (Kg/ADT)	N total (Kg/ADT)	P total (Kg/ADT)	SST (Kg/ADT)	Flujo del efluente (m ³ /ADT)
BAT	23	1,5	0,25	0,25	0,030	1,5	50
Límites permitidos#	15	0,70	0,15	0,20	0,02	1,0	-
Promedio enero-abril 2018	4,52	0,17	0,033	0,038	0,008	0,18	19,0
Período de muestreo abril-mayo 2018	6,02	0,26	0,039	0,11	0,023	1,08	18,5

*ADT = Tonelada de pulpa seca (ADT por sus siglas en inglés: “Air Dried Ton of pulp”)

Los límites son a escala anual

PERÍODO Y ÁREAS DE ESTUDIO

La comunidad de peces fue estudiada entre los días 28 de abril y 3 de mayo de 2018, en los mismos sitios analizados durante los estudios de línea de base y monitoreos previos. Los sitios de muestreo fueron situados en el área referencia de Nuevo Berlín (área A; 32°58'42"S, 58°04'02"O), en la zona receptora cercana del efluente, en Fray Bentos (área B; 33°04'41"S, 58°16'15"O) y en la zona receptora lejana en Las Cañas (área C; 39°09'41"S, 58°22'11"O) (Fig. 1).

En estas mismas áreas, un equipo de trabajo del Laboratorio Tecnológico del Uruguay toma muestras regularmente para el estudio de calidad de agua, plancton y fauna bentónica de acuerdo con el mismo plan de monitoreo (LATU, 2014). Los estudios de músculo y bilis de peces con diferente exposición al efluente también fueron realizados en dichas áreas y serán reportados en el informe de exposición abril 2018 (López-Rodríguez *et al.*, 2018, *en preparación.*).




Figura 1. Áreas de monitoreo de la comunidad de peces. Área A: Nuevo Berlín como área de referencia. Área B: Fray Bentos, bahía del Arroyo Yaguareté como área receptora cercana al efluente de UPM S.A. Área C: Las Cañas como área receptora lejana del efluente de la planta de UPM S.A. Figura modificada de D'Anatro *et al.* (2013).

Para el muestreo de peces se utilizaron redes Nórdicas estándar de 30 m de largo y 1,5 m de altura, las cuales consisten de 12 paños de 2,5 m de largo cada uno, de tamaños diferentes de malla, con distancia entrenudo de: 5,0; 6,25; 8,0; 10; 12,5; 15,5; 19,5; 24; 29; 35; 43 y 55 mm respectivamente. Las redes se calaron al atardecer (aprox. 18:00 hs) y fueron levantadas al amanecer (aprox. a las 8:00 hs), con un tiempo aproximado de 14 hs. de permanencia en el agua. En cada área se utilizaron ocho redes, calándose cuatro sets, cada uno consiste de dos redes unidas en serie, de los cuales se sitúan dos en la zona litoral (dos réplicas) y dos en la zona media (dos réplicas). La distancia entre las dos replicas fue de aproximadamente 300 m y la distancia entre redes de la zona litoral y media fue de aproximadamente 500 m. El muestreo se desarrolló en la zona A, luego en la zona B y por último en la zona C, de idéntica forma y repetido con tres días de diferencia en un mismo sitio. En total 16 redes fueron caladas en cada sitio, 8 en la zona litoral y 8 en la zona media.

Los peces fueron identificados al mínimo nivel taxonómico posible (nivel de especie en la mayoría de los casos) y separados en clases de tamaño cada ca. 1,0 ó 0,5 cm de diferencia (según el tamaño

y especie), medidos (largo estándar, milímetros) y pesados (masa total, gramos), siguiendo el mismo procedimiento realizado desde el inicio de los estudios de línea de base (e.g. Tana, 2007; López-Rodríguez *et al.* 2017a).

La especie *Iheringichthys labrosus* (Siluriformes, Pimelodidae) fue utilizada como indicadora para el estudio de la condición general de los peces entre la zona referencia y las zona receptora del efluente. Como indicadores se utilizaron el Factor de Condición (FC), el Índice Gonadosomático (IGS) y el Índice Hepatosomático (IHS) de una sub-muestra de esta especie, utilizando individuos adultos incluidos en una o más réplicas dependiendo de la abundancia de la especie.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS.

Período 2005- 2018

Para comparar la biomasa y abundancia de peces capturada por unidad de esfuerzo entre el período de línea de base y los períodos de monitoreo posteriores a la puesta en marcha de UPM S.A. entre los sitios receptores y el de referencia, se utilizó un test de ANOVA factorial de 2 vías ($\alpha = 0,05$). Estos tests permiten seguir la metodología BACI comparando parámetros antes y después entre la zona de referencia y aquellas potencialmente impactadas. Como situación de línea de base se utilizan los muestreos de comunidad de peces desde 2005 a 2007 y, como situación posterior a la instalación de la planta de UPM S.A. los muestreos de comunidad de peces entre 2008-2018. Cabe resaltar que durante los muestreos de línea de base del año 2005 y el muestreo de abril de 2006 no se separaron las capturas de peces en dos réplicas litorales y dos pelágicas por sitio, como se hizo posteriormente. Por este motivo, los datos de estos muestreos se presentan como un sólo valor promedio de Captura de peces Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) por cada muestreo.

Período abril 2018

Comparación de capturas entre hábitats

Para comparar estadísticamente las variaciones en la riqueza específica, biomasa y abundancia capturadas por unidad de esfuerzo entre el hábitat litoral y la zona media de cada sitio, cada set de redes (cada set consiste de dos redes unidas en serie) fue tratado como réplica, sin considerar las

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Igua 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-

Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

posibles diferencias entre los días de muestreo (4 réplicas litorales vs. 4 réplicas en la zona media). Estas diferencias fueron analizadas mediante un test ANOVA ($\alpha = 0,05$) y Tukey *post hoc* siempre que se cumplieron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza, de lo contrario se utilizaron las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney *post hoc*. La potencial diferencia en las capturas entre los dos muestreos ha sido testeada de manera similar, agrupando zona litoral y zona media en cada sitio y tratando cada set de redes dispuesto en un mismo día de muestreo como una réplica ($n = 4$ réplicas en la primer semana vs. $n = 4$ réplicas en la segunda semana).

Comparación de capturas entre sitios

Para comparar la riqueza específica, biomasa y abundancia de peces entre la zona referencia y las zonas receptoras del efluente se estandarizaron las capturas de acuerdo a una misma unidad de esfuerzo, fijada en una red en el caso de biomasa y abundancia, y en un set de redes en el caso de la diversidad específica. Esta estandarización se lleva a cabo debido a que en ocasiones las redes sufren daños o roturas de magnitud y no pueden ser consideradas para los análisis. Luego de la estandarización, los valores comparados corresponden al número medio de especies, abundancia y biomasa capturadas dada una misma unidad de esfuerzo (CPUE). En cada zona, cada set de redes dispuesto fue utilizado como una réplica indistintamente del día de muestreo o el hábitat, de modo de obtener parámetros de captura que integren la variabilidad en el espacio (zona media y litoral) y tiempo (dos muestreos con tres días de diferencia, $n = 8$ réplicas en cada sitio). Las diferencias en estos parámetros de captura fueron analizadas mediante un ANOVA, seguido de pruebas de Tukey a posteriori en caso de encontrar diferencias significativas ($\alpha = 0,05$). En el caso de incumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad, se utilizaron los tests de Kruskal-Wallis, seguido del test de Mann-Whitney ($\alpha = 0,05$).

Comparación de la condición general de la especie indicadora

Los peces fueron examinados externamente con el fin de detectar deformidades y anormalidades macroscópicas en el cuerpo y aletas como posibles rasgos indicadores de enfermedades.

La variabilidad en la condición de los peces entre áreas también puede ser determinada estudiando índices indicadores de estado y salud de los individuos, como por ejemplo, la variabilidad en la relación del peso de los peces, así como el peso de su hígado y de las gónadas respecto a su tamaño corporal. En este caso el Factor de Condición de Fulton estudiado [$FC = 100 \times (\text{peso corporal}/(\text{largo}$

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Igua 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-

Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

estándar)^{3]} describe que tan “gordos” o “delgados” están los peces en cada área (Froese, 2006) y los Índices Hepato-Somático [IHS = $100 \times (\text{peso del hígado}/\text{peso corporal})$] y Gonado-Somático [IGS = $100 \times (\text{peso de las gónadas}/\text{peso corporal})$] en relación al tamaño corporal pueden dar indicaciones de posibles alteraciones en la reproducción y el metabolismo en general de los animales (Wootton, 1991).

Para comparar estadísticamente diferencias en estos indicadores, se consideraron únicamente las hembras de *Iheringichthys labrosus* mayores a 13 cm de largo estándar (criterio basado en observaciones personales del grupo de trabajo sobre tamaño de primera madurez de esta especie en esta zona del Río Uruguay). Las comparaciones de FC, IHS e IGS entre las tres áreas se realizaron mediante tests de ANOVA (para los datos que se ajustaron a distribución normal y homogeneidad de varianza), seguido del test de Tukey en caso de encontrarse diferencias significativas. Cuando los datos no cumplieron con los supuestos, se utilizó el test Kruskal-Wallis, seguido del test de Mann-Whitney en caso de encontrar diferencias significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Período 2005- diciembre 2018

El número de especies colectadas ha sido altamente variable entre años a lo largo de todo el período de muestreo, oscilando entre 3 y 32 especies colectadas en promedio por set de redes. La variación temporal en la riqueza aparenta ser consistente entre las tres áreas, observándose picos de riqueza durante los muestreos de Diciembre de 2008 y Diciembre de 2010 en las tres zonas. Sin embargo, la mayor riqueza específica de todo el período fue capturada durante el muestreo de diciembre de 2016 en Nuevo Berlín, con 32 especies en una misma réplica, no coincidiendo con aumentos de riqueza en Fray Bentos o Las Cañas en ese período (Figura 2). La riqueza por unidad de esfuerzo en el período post-UPM fue mayor que aquella encontrada en el período de línea de base (K-W, $\text{Chi}^2 = 5,39$; $p = 0,02$), lo que podría deberse a que en el período posterior a la instalación de la planta, existe mayor número de eventos de muestreo, generando la posibilidad de capturar de forma continua un mayor número de especies (Fig. 2, Apéndice 1). El análisis estadístico reveló que la riqueza específica también difiere entre los sitios de muestreo, siendo siempre significativamente menor en Las Cañas (K-W, $\text{Chi}^2 = 58,51$; $p < 0,001$) (Fig. 2, Apéndice 1). Cabe destacar que estas

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Igua 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

diferencias entre los tres sitios, ya fueron encontradas en los estudios de línea de base (Tana, 2007), y no han cambiado luego de la puesta en marcha de la planta de UPM S.A. (Tabla 3).

La CPUE en términos de abundancia total no mostró variaciones estadísticamente significativas durante el período post-UPM en comparación con el período pre-UPM (línea de base) (ANOVA, $F = 0,61$; $p = 0,44$; Fig. 3, Apéndice 1). En el caso de la comparación entre sitios de muestreo, se observa que la CPUE abundancia total fue menor en Las Cañas, intermedia en Nuevo Berlín y mayor en Fray Bentos (ANOVA, $F = 4,49$; $p < 0,001$, diferencias entre sitios: test *post hoc* Tukey). Sin embargo, en el período pre-UPM las abundancias en Nuevo Berlín y Fray Bentos eran aparentemente similares, y diferentes entre Nuevo Berlín y Las Cañas (siendo mayor en Nuevo Berlín). Sin embargo, dichas diferencias no fueron analizadas estadísticamente, por lo que no se puede establecer la magnitud de las mismas. En el período post-UPM, la abundancia en Fray Bentos es mayor que en Nuevo Berlín y Las Cañas (ANOVA, $F = 4,18$; $p = 0,020$ en la interacción sitio*período; diferencias significativas entre estos sitios: Test *Post hoc* Tukey) (Apéndice 1).

La CPUE en términos de biomasa tampoco mostró diferencias entre el período pre y post-UPM (ANOVA, $F = 0,12$; $p = 0,73$) pero sí mostró diferencias entre los tres sitios de estudio ($F = 65,2$; $p < 0,001$;), siendo menor en las zona de Las Cañas, intermedia en Nuevo Berlín y máxima en Fray Bentos (Test *Post hoc* Tukey Figs. 4 y 5; Apéndice 1) siguiendo la misma tendencia a lo observado en muestreos anteriores (e.g. López-Rodríguez *et al.*, 2016a; López-Rodríguez *et al.*, 2017a). Sin embargo, en el período pre-UPM la biomasa en Nuevo Berlín no difería de la biomasa en Fray Bentos ($p > 0,05$), como sí sucede en el período post-UPM (ANOVA, $F = 3,27$; $p = 0,04$, en la interacción sitio*período; diferencias significativas entre estos sitios: Test *Post hoc* Tukey) observándose una biomasa mayor en Fray Bentos que en Nuevo Berlín. Esto podría ser producto del aumento en el número de muestreos en el período post-UPM (dos muestreos anuales), lo cual posibilita la detección estadística de diferencias más sutiles.

La consistencia en las oscilaciones temporales de las capturas en términos de riqueza, abundancia y biomasa de peces, sugiere que esta dinámica puede estar asociada a la variación en algunos parámetros ambientales (e.g. caudal del río), oscilando de forma similar en las tres áreas de estudio. Por ejemplo, las mayores capturas registradas (en biomasa) durante el período de estudio ocurrieron en abril del año 2010, luego de un pico máximo de caudal del Río Uruguay registrado en la

primavera-verano de 2009 (Fig. 5). De forma similar, luego del aumento del nivel del río ocurrido entre diciembre 2015 y abril 2016, se registró un pico en la biomasa de peces en los tres sitios de estudio (en el muestreo de primavera de 2016, Fig. 5). Relaciones positivas entre el nivel del río y la abundancia de peces en sistemas cercanos como el río Paraná, han sido registradas para varias especies de peces de importancia comercial (e.g. Oldani, 1990; Stassen *et al.*, 2010). De forma similar, la biomasa total y relativa de sábalo (*Prochilodus lineatus*) en el periodo 2005-2018 en nuestros estudios, se correlaciona positivamente con el nivel promedio del río en el año anterior al muestreo (González-Bergonzoni *et al*, en revisión).




Figura 2. Evolución de la riqueza específica de peces colectada por unidad de esfuerzo desde los estudios de línea de base (abril de 2005) hasta el presente período (abril de 2018) en los tres sitios muestreados, integrando la variabilidad espacial y temporal de cada muestreo ($n = 8$ por sitio por muestreo). En verde: área referencia de Nuevo Berlín; en azul: área receptora inmediata de Fray Bentos; en rojo: área receptora lejana de Las Cañas. La fecha de puesta en funcionamiento de la planta de UPM S.A. está indicada con línea punteada (noviembre 2007). Las líneas de los boxplots indican la mediana de los datos, la parte inferior de la caja indica el percentil 25 y la parte superior el percentil 75 y las líneas verticales de las cajas indican los valores máximos y mínimos encontrados para cada fecha de muestreo. Las líneas verticales a la izquierda de los boxplots indican la media y el desvío estándar.




Figura 3. Evolución de la abundancia de peces colectada por unidad de esfuerzo desde los estudios de línea de base (abril de 2005) hasta el presente período (abril de 2018) en los tres sitios muestreados, integrando la variabilidad espacial y temporal de cada muestreo ($n = 8$ por sitio por muestreo). En verde: área referencia de Nuevo Berlín; en azul: área receptora inmediata de Fray Bentos; en rojo: área receptora lejana de Las Cañas. La fecha de puesta en funcionamiento de la planta de UPM S.A. está indicada con línea punteada (Noviembre 2007). Las líneas de los boxplots indican la mediana de los datos, la parte inferior de la caja indica el percentil 25 y la parte superior el percentil 75 y las líneas verticales de las cajas indican los valores máximos y mínimos encontrados para cada fecha de muestreo. Las líneas verticales a la izquierda de los boxplots indican la media y el desvío estándar.




Figura 4. Evolución de la biomasa de peces colectada por unidad de esfuerzo desde los estudios de línea de base (abril de 2005) hasta el presente período (abril de 2018) en los tres sitios muestreados, integrando la variabilidad espacial y temporal de cada muestreo ($n = 8$ por sitio por muestreo). En verde: área referencia de Nuevo Berlín; en azul: área receptora inmediata de Fray Bentos; en rojo: área receptora lejana de Las Cañas. La fecha de puesta en funcionamiento de la planta de UPM S.A. está indicada con línea punteada (Noviembre 2007). Las líneas de los boxplots indican la mediana de los datos, la parte inferior de la caja indica el percentil 25 y la parte superior el percentil 75 y las líneas verticales de las cajas indican los valores máximos y mínimos encontrados para cada fecha de muestreo. Las líneas verticales a la izquierda de los boxplots indican la media y el desvío estándar.




Figura 5. Variaciones en el caudal del Río Uruguay (arriba, nivel del río medido en Fray Bentos, en cm.) y evolución de la biomasa de peces colectada por unidad de esfuerzo desde los estudios de línea de base (abril de 2005) hasta el presente período (abril de 2018) (abajo). En verde: área referencia de Nuevo Berlín; en azul: área receptora inmediata de Fray Bentos; en rojo: área receptora lejana en Las Cañas.

Período abril 2018

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE PECES

Durante el presente período de monitoreo fueron colectadas un total de 56 especies entre los tres sitios, encontrándose 43 especies en Nuevo Berlín, 39 en Fray Bentos y 36 en Las Cañas (Tabla 2, Apéndice 2). Los valores de Nuevo Berlín son más bajos que los obtenidos en el monitoreo previo

llevado a cabo en diciembre 2017, mientras que en Las Cañas y Fray Bentos, el número de especies aumentó (López-Rodríguez *et al.*, 2017b). Por otra parte, todas las especies colectadas coinciden con las registradas previamente, incluyendo los estudios de línea de base (Tana, 2007, 2013, 2014; González-Bergonzoni *et al.* 2015a, 2016a, López-Rodríguez *et al.*, 2016a, 2017a) (Apéndice 2). El número total de especies colectadas durante este programa de monitoreo se detallan en el Apéndice 2.

En términos de biomasa total colectada (considerando el total de las 16 redes colocadas por sitio entre los dos días de muestreo, en los tres sitios de estudio), *Megaleporinus obtusidens*, *Cynopotamus argenteus*, *Iheringichthys labrosus*, *Prochilodus lineatus*, *Loricariichthys melanochelius* y *Cyphocharax platanus* fueron las especies más importantes, superando cada una de ellas los 10,0 Kg capturados por red. Sin embargo, a pesar de estar presentes en todos los sitios, muestran diferentes abundancias y biomasa relativas en cada sitio (Tabla 2). De estas especies, cabe destacar que *M. obtusidens* (Boga, anteriormente nombrada como *Leporinus obtusidens*) fue la especie que presentó mayor biomasa total (más de 26,0 Kg, representando el 16% del total colectado; Tabla 2, Figura 6). A pesar de repetirse el patrón del muestreo pasado, con esta especie como dominante en biomasa, cabe resaltar que la biomasa capturada en este muestreo representa la mitad de lo capturado en el muestreo de diciembre de 2017; y es muy similar a la encontrada en abril de 2017 (López-Rodríguez *et al.*, 2017a,b). Asimismo, es importante destacar que a pesar de ser la especie dominante en términos de biomasa, únicamente representa el 2% de la abundancia total capturada en el muestreo (Tabla 2). Al analizar los sitios por separado, se observa que *M. obtusidens* fue la especie dominante en términos de biomasa únicamente en Nuevo Berlín (más de 12,0 kg, representando un 21 % de la biomasa total en esa localidad; Tabla 2). Este patrón se observó también en el muestreo de diciembre de 2017 (López-Rodríguez *et al.*, 2017b). Las mayores biomasa de esta especie en Nuevo Berlín podrían deberse a que este punto se encuentra aguas debajo de Esteros de Farrapos, sitio que podría estar actuando como zona de cría, propagándose los juveniles aguas abajo. Por su parte, en Fray Bentos existió una dominancia en términos de biomasa de *I. labrosus* (más de 9,0 kg, correspondiente al 14% de la biomasa en ese punto de muestreo; Tabla 2). Finalmente, en Las Cañas se destaca a *C. argenteus* como la especie con mayor biomasa (más de 8,5 kg y 22% del total), seguida por *M. obtusidens* (ca. 7,0 kg y representando el 17% del total de la biomasa de Las Cañas) (Tabla 2).

Por otra parte, cabe destacar la elevada biomasa de *I. labrosus* considerando los tres sitios de muestreo, la cual representa un total de ca. 22,0 kg, siendo con este valor la tercera especie más

importante en términos de biomasa. Cuando se analizan los sitios por separado, se observa que, esta especie fue la segunda más abundante en términos de biomasa en Fray Bentos, la tercera en Nuevo Berlín y la cuarta en Las Cañas (ca. 9,0 kg, 8,0 kg y ca. 5,0 kg, respectivamente). Al igual que lo sucedido en diciembre de 2017, esta especie fue la más representada en términos de abundancia total, representando aproximadamente el 35% de los individuos colectados (Tabla 2, Figura 6).

Durante el presente monitoreo se han observado algunos patrones que tienden a ser estacionales en las capturas y que parecen repetirse con varias especies a lo largo de todo el período de estudio (e.g. Apéndices 3 y 4). En este sentido, observamos que la abundancia y biomasa de *P. valenciennisi* mostró un comportamiento similar en muestreos de otoño previos, con menores abundancias que en los muestreos de primavera. Estos cambios en abundancia estacionales han ocurrido durante básicamente todos los monitoreos efectuados hasta el momento (Apéndice 4). Las fluctuaciones observadas podrían corresponder a migraciones reproductivas y/o alimenticias de esta especie durante primavera.

A lo largo de todos los años de estudio (2005-2018) y en forma general, la abundancia y biomasa de especies piscívoras tales como *Acestrorhynchus pantaneiro* (dientado paraguayo), disminuyen en los muestreos de primavera (e.g. González-Bergonzoni *et al.*, 2015) (e.g. Apéndice 3). En este sentido, en el presente muestreo, la biomasa del dientado paraguayo muestra valores similares a los encontrados en el muestreo de abril de 2017 (ca. 3,5 kg en el presente muestreo vs. 4,3 kg en muestreo anterior de abril de 2017) (López-Rodríguez *et al.*, 2017a).

Tabla 2. Resumen de las capturas de peces en el presente período de estudio (abril 2018) en las zonas de Nuevo Berlín, Fray Bentos, Las Cañas y en el total de los tres sitios, listado por especie. Se reporta la abundancia total (“AB total”, en número de individuos), abundancia relativa (“AB rel”, en proporción de la abundancia total), biomasa total (“BM total”, en gramos) y biomasa relativa (“BM rel”, en proporción de la biomasa total). Las especies se encuentran ordenadas de forma decreciente de acuerdo a su importancia en biomasa total colectada en los tres sitios.

Especie	Nuevo Berlín		Fray Bentos		Las Cañas		Totales	
	AB total (AB rel.)	BM total (BM rel.)	AB total (AB rel.)	BM total (BM rel.)	AB total (AB rel.)	BM total (BM rel.)	AB total (AB rel.)	BM total (BM rel.)
<i>Megaleporinus obtusidens</i>	33(0,028)	12621(0,21)	28(0,018)	7127,1(0,107)	21(0,02)	6768(0,167)	82(0,021)	26516,1(0,158)
<i>Cynopotamus argenteus</i>	87(0,072)	8529(0,14)	84(0,053)	5933,6(0,089)	62(0,06)	8717,9(0,215)	233(0,061)	23180,5(0,138)
<i>Iheringichthys labrosus</i>	323(0,267)	8164,7(0,13)	615(0,385)	8965,8(0,135)	389(0,376)	4940(0,122)	1327(0,345)	22070,5(0,131)
<i>Prochilodus lineatus</i>	29(0,024)	8160(0,13)	13(0,008)	6160(0,093)	15(0,014)	5178,2(0,128)	57(0,015)	19498,2(0,116)
<i>Loricariichthys melanocheilus</i>	16(0,013)	1429,6(0,022)	71(0,044)	8498,4(0,128)	11(0,011)	426,6(0,011)	98(0,026)	10354,6(0,062)
<i>Paraloricaria vetula</i>	13(0,011)	3318,5(0,054)	12(0,008)	4718(0,071)	(0)	(0)	25(0,007)	8036,5(0,048)
<i>Galeocharax humeralis</i>	53(0,044)	2774(0,045)	61(0,038)	2173,2(0,033)	50(0,048)	2029,3(0,05)	164(0,043)	6976,5(0,042)
<i>Astyanax sp.</i>	144(0,119)	1425(0,023)	107(0,067)	1165,7(0,018)	186(0,18)	2149,9(0,053)	437(0,114)	4740,6(0,028)
<i>Pachyurus bonariensis</i>	95(0,079)	1779,4(0,029)	70(0,044)	1663,4(0,025)	31(0,03)	708,5(0,017)	196(0,051)	4151,3(0,025)
<i>Lycengraulis grossidens</i>	19(0,016)	508,2(0,008)	158(0,099)	1449(0,022)	96(0,091)	1976,2(0,049)	273(0,071)	3933,4(0,023)
<i>Hoplias malabaricus</i>	(0)	(0)	5(0,003)	2458(0,037)	2(0,002)	962(0,024)	7(0,002)	3420(0,02)
<i>Acestrorhynchus pantaneiro</i>	9(0,007)	1082,3(0,018)	10(0,006)	2135,7(0,032)	1(0,001)	73,4(0,002)	20(0,006)	3291,4(0,02)
<i>Cyphocharax platanus</i>	13(0,011)	592,9(0,01)	40(0,025)	2123,9(0,032)	9(0,009)	331,7(0,008)	62(0,016)	3048,5(0,02)
<i>Parapimelodus valenciennes</i>	12(0,01)	185,8(0,003)	186(0,116)	2444,7(0,037)	14(0,014)	108(0,003)	212(0,055)	2738,5(0,016)
<i>Pimelodus maculatus</i>	1(0,001)	48,9(0,001)	5(0,003)	1254(0,019)	3(0,003)	1158,5(0,029)	9(0,002)	2461,4(0,015)
<i>Rhaphiodon vulpinus</i>	1(0,001)	962(0,016)	4(0,003)	530(0,008)	7(0,007)	750,4(0,019)	12(0,003)	2242,4(0,013)
<i>Loricariichthys anus</i>	2(0,002)	1142(0,019)	1(0,0006)	1054(0,016)	(0)	(0)	3(0,0008)	2196(0,013)
<i>Ageneiosus militaris</i>	1(0,0008)	346(0,006)	(0)	(0)	4(0,004)	1374(0,034)	5(0,001)	1720(0,01)
<i>Pimelodus absconditus</i>	42(0,035)	1668,3(0,027)	(0)	(0)	(0)	(0)	42(0,011)	1668,3(0,01)
<i>Hypostomus commersoni</i>	2(0,002)	274,2(0,004)	3(0,002)	1258(0,019)	(0)	(0)	5(0,001)	1532,2(0,01)
<i>Apareiodon affinis</i>	42(0,035)	533,1(0,009)	65(0,041)	750(0,011)	13(0,013)	137,7(0,003)	120(0,031)	1420,8(0,008)
<i>Pimelodella gracilis</i>	144(0,119)	1289,3(0,021)	8(0,005)	91,3(0,001)	1(0,001)	10,1(0,0002)	153(0,04)	1390,7(0,008)
<i>Ricola macrops</i>	9(0,007)	559,9(0,009)	9(0,006)	700,7(0,011)	1(0,001)	9,4(0,0002)	19(0,005)	1270(0,008)
<i>Salminus brasiliensis</i>	1(0,001)	521(0,009)	(0)	(0)	1(0,001)	594(0,015)	2(0,0005)	1115(0,007)
<i>Schizodon platae</i>	(0)	(0)	3(0,002)	1092(0,016)	(0)	(0)	3(0,0008)	1092(0,006)
<i>Pellona flavipinnis</i>	4(0,003)	428,6(0,007)	1(0,0006)	83,4(0,001)	8(0,008)	515(0,013)	13(0,003)	1027(0,006)
<i>Astyanax abramis</i>	20(0,017)	657,6(0,012)	8(0,005)	215,5(0,003)	5(0,005)	129,6(0,003)	33(0,009)	1002,7(0,006)
<i>Serrasalmus maculatus</i>	7(0,006)	773,8(0,013)	1(0,0006)	220(0,003)	(0)	(0)	8(0,002)	993,8(0,006)
<i>Luciopimelodus pati</i>	1(0,001)	72(0,001)	2(0,001)	854(0,013)	1(0,001)	58,5(0,001)	4(0,001)	984,5(0,006)
<i>Catathyridium jenynsii</i>	1(0,001)	356(0,006)	1(0,0006)	298(0,004)	(0)	(0)	2(0,0005)	654(0,004)
<i>Hypostomus laplatanus</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	2(0,002)	608(0,015)	2(0,0005)	608(0,004)
<i>Pygocentrus nattereri</i>	(0)	(0)	1(0,0006)	424(0,006)	(0)	(0)	1(0,0003)	424(0,003)
<i>Oligosarcus jenynsii</i>	(0)	(0)	1(0,0006)	20,6(0,0003)	11(0,011)	398,7(0,01)	12(0,003)	419,3(0,002)

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

<i>Steindachnerina brevipinna</i>	15(0,012)	312,8(0,005)	2(0,001)	27(0,0004)	2(0,002)	25,6(0,0006)	19(0,005)	365,4(0,002)
<i>Trachelyopterus galeatus</i>	1(0,001)	122(0,002)	2(0,001)	192(0,003)	(0)	(0)	3(0,0008)	314(0,002)
<i>Trachelyopterus teaguei</i>	(0)	(0)	2(0,001)	187(0,003)	(0)	(0)	2(0,0005)	187(0,001)
<i>Hypostomus sp.</i>	1(0,001)	164(0,003)	(0)	(0)	(0)	(0)	1(0,0003)	164(0,001)
<i>Bryconamericus stramineus</i>	44(0,036)	74,4(0,001)	5(0,003)	8,3(0,0001)	33(0,032)	64,4(0,002)	82(0,021)	147,1(0,0009)
<i>Odontesthes humensis</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	1(0,001)	116,2(0,003)	1(0,0003)	116,2(0,0007)
<i>Platanichthys platana</i>	5(0,004)	11,8(0,0002)	7(0,004)	16,7(0,0003)	38(0,037)	80,2(0,002)	50(0,013)	108,7(0,0006)
<i>Oligosarcus oligolepis</i>	1(0,001)	60,4(0,001)	(0)	(0)	1(0,001)	22,7(0,0006)	2(0,0005)	83,1(0,0005)
<i>Auchenipterus nuchalis</i>	1(0,001)	32,1(0,001)	(0)	(0)	3(0,003)	44(0,001)	4(0,001)	76,1(0,0005)
<i>Auchenipterus osteomystax</i>	2(0,002)	76(0,001)	(0)	(0)	(0)	(0)	2(0,0005)	76(0,0005)
<i>Crenichthys missionera</i>	2(0,002)	63,3(0,001)	(0)	(0)	(0)	(0)	2(0,0005)	63,3(0,0004)
<i>Cyphocharax spilatus</i>	4(0,003)	57,5(0,001)	(0)	(0)	(0)	(0)	4(0,001)	57,5(0,0003)
<i>Pimelodella australis</i>	4(0,003)	34,9(0,001)	1(0,0006)	5(0,00008)	1(0,001)	5,7(0,0001)	6(0,002)	45,6(0,0003)
<i>Astyanax fasciatus</i>	2(0,002)	42,1(0,001)	(0)	(0)	(0)	(0)	2(0,0005)	42,1(0,0003)
<i>Odontesthes perugiae</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	1(0,001)	9,9(0,0002)	1(0,0003)	9,9(0,00006)
<i>Cheirodon interruptus</i>	(0)	(0)	1(0,0006)	1,9(0,00003)	4(0,004)	7,5(0,0002)	5(0,001)	9,4(0,00006)
<i>Otocinclus sp.</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	5(0,005)	7,2(0,0002)	5(0,001)	7,2(0,00004)
<i>Loricariichthys edentatus</i>	1(0,001)	3,7(0,0001)	(0)	(0)	(0)	(0)	1(0,0003)	3,7(0,00002)
<i>Hyphessobrycon meridionalis</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	2(0,002)	3,1(0,00008)	2(0,0005)	3,1(0,00002)
<i>Odontostilbe pequirá</i>	1(0,001)	1(0,00002)	2(0,001)	2(0,00003)	(0)	(0)	3(0,0008)	3(0,00002)
<i>Crenichthys minuano</i>	1(0,001)	2,4(0,00004)	(0)	(0)	(0)	(0)	1(0,0003)	2,4(0,00001)
<i>Charax sp.</i>	(0)	(0)	1(0,0006)	1,4(0,00002)	(0)	(0)	1(0,0003)	1,4(0,00001)
<i>Crenichthys vittata</i>	(0)	(0)	1(0,0006)	1,2(0,00002)	(0)	(0)	1(0,0003)	1,2(0,00001)

Anahí López-Rodríguez ², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D' Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy




Figura 6: Composición específica de la comunidad en términos de abundancia y biomasa relativa de cada especie colectada en abril 2018 en la suma de los tres sitios estudiados. Se omiten los valores inferiores al 1% para optimizar la visualización. Los detalles y datos específicos para cada sitio de muestreo se muestran en la Tabla 2.

Comparación de capturas entre ambientes y muestreos

Las capturas de peces, en términos de abundancia por red no difirieron entre días de muestreo en ninguno de los tres sitios (ANOVA, $p > 0,05$ en los tres sitios) (Figura 7; Apéndice 1).

En lo que refiere a la biomasa capturada, sí se encontraron diferencias entre días de muestreo en las localidades de Nuevo Berlín y Las Cañas, con un aumento hacia el segundo día de muestreo en ambos sitios ($F = 8,55$, $p < 0,05$ en Nuevo Berlín; $F = 7,55$, $p < 0,05$ en Las Cañas). En este caso, tampoco se hallaron diferencias entre días de muestreo para Fray Bentos ($p > 0,05$) (Figura 7; Apéndice 1).

Finalmente, al comparar la riqueza de especies capturada entre semanas, no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los tres sitios de muestreo (Tabla 3; Figura 7).

Por otra parte, al comparar las áreas muestreadas en los tres sitios (litoral vs. zona media) se encontraron diferencias en la riqueza de especies de Nuevo Berlín y Las Cañas, siendo en ambos casos, mayor en la zona litoral que en la zona media ($\chi^2 = 4,34$; $p < 0,05$ para Nuevo Berlín; $F = 17,27$; $p > 0,05$ para Las Cañas) (Figura 8; Apéndice 1). Se encontraron también diferencias en la

Anahí López-Rodríguez ², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-
Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

biomasa de peces en la localidad de Las Cañas, con una mayor biomasa en la zona litoral que en la zona media ($F = 8,06$, $p < 0,05$) (Figura 8; Apéndice 1). Sin embargo, no se encontraron diferencias en abundancia en ninguno de las tres estaciones de muestreo (Figura 8; Apéndice 1).

Las diferencias en el uso del espacio por la comunidad de peces en Las Cañas, con mayor biomasa y riqueza en la zona litoral, pueden deberse a que las condiciones del ambiente son diferentes a las halladas en las otras zonas analizadas. En este sentido, Las Cañas se presenta como un sistema más abierto y con fondos arenosos donde el río es más ancho, pudiendo favorecer el uso diferencial del ambiente por parte de la comunidad, en comparación a los fondos predominantes con roca, limo y detrito en Nuevo Berlín y Fray Bentos (LATU, 2014).




Figura 7. Comparación CPUE (abundancia, biomasa total y riqueza específica capturada por red) entre los diferentes días de muestreo en cada sitio. En verde: área referencia de Nuevo Berlín; en azul: área receptora inmediata de Fray Bentos; en rojo: área receptora lejana en Las Cañas. Diferencias significativas ($p < 0,05$) se señalan con*. Las líneas de los boxplots indican la mediana de los datos, las líneas verticales indican los valores máximos y mínimos encontrados para cada fecha de muestreo.




Figura 8. Comparación CPUE (abundancia, biomasa total y riqueza específica capturada por red) entre los diferentes hábitats muestreados en cada sitio. En verde: área referencia de Nuevo Berlín; en azul: área receptora inmediata de Fray Bentos; en rojo: área receptora lejana en Las Cañas. Diferencias significativas ($p < 0,05$) marcadas con*. Las líneas de los boxplots indican la mediana de los datos, las líneas verticales indican los valores máximos y mínimos encontrados para cada fecha de muestreo.

Comparación de capturas entre sitios

A pesar de existir diferencias entre semanas y/o zonas de muestreo en algunos sitios, las capturas de la zona media y litoral fueron agrupadas para ambas fechas de muestreo, con el fin de poder comparar el sitio de referencia con los sitios receptores del efluente. En este caso, se observa que existieron diferencias entre las tres áreas en términos de abundancia de peces, siendo estos valores menores en Las Cañas, intermedios en Nuevo Berlín y mayores en Fray Bentos (K-W, $\chi^2 = 8,02$; $p = 0,02$ - Test *post hoc* Mann Whitney) (Figura 9, Apéndice 1). En el caso de la biomasa, se observaron diferencias entre Las Cañas y los otros dos sitios, siendo Las Cañas la localidad que presentó valores más bajos (ANOVA, $F = 4,23$; $p = 0,03$ – Test *post hoc* Tukey) (Figura 9, Apéndice 1). Finalmente, al comparar la riqueza de especies, no se encontraron diferencias entre los sitios de muestreo (Figura 9, Apéndice 1).




Figura 9. Comparación de capturas de peces por unidad de esfuerzo en términos de abundancia (arriba); biomasa (centro) y riqueza específica (abajo) entre los diferentes sitios muestreados, integrando la variabilidad espacial y temporal del muestreo ($n = 8$ por sitio). Área referencia: Nuevo Berlín; área receptora inmediata: Fray Bentos; área receptora lejana: Las Cañas. Se observan diferencias significativas en dos de los tres parámetros analizados (abundancia y biomasa). Véase el apéndice 1 por más detalles sobre los análisis estadísticos realizados. Las líneas de los boxplots indican la mediana de los datos, la parte inferior de la caja indica el percentil 25 y la parte superior el percentil 75 y las líneas verticales de las cajas indican los valores máximos y mínimos encontrados para cada sitio de muestreo.

COMPARACIÓN DE LA CONDICIÓN GENERAL DE LA ESPECIE SELECCIONADA COMO CENTINELA

La dominancia y frecuencia de ocurrencia de la especie centinela seleccionada, *I. labrosus*, en el sistema se mantiene desde los estudios de línea de base, donde esta especie fue elegida principalmente debido a estas características.

Para estudiar la condición de la especie modelo se utilizan las hembras mayores a 13 cm de longitud estándar, debido a que se ha constatado que a los 11,5 cm sería la longitud a la que los peces alcanzarían su madurez (de Santana *et al.*, 2016). Al utilizar 13 cm como límite inferior nos asegurarnos que ya alcanzaron ese estadio.

Al analizar la sub-muestra de hembras colectadas mayores a 13 cm de longitud estándar, observamos que los individuos no presentaron diferencias en su factor de condición (FC) entre ninguna de las tres zonas de estudio (Kruskal-Wallis: $\chi^2 = 0,027$; $p > 0,05$) (Tabla 3; Apéndice 1).

En el caso del IHS (índice hepatosomático), tampoco se encontraron diferencias significativas entre las localidades muestreadas (ANOVA: $F = 0,60$; $p > 0,05$) (Tabla 3; Apéndice 1). Este resultado hace referencia a que el peso de los hígados de los individuos en proporción a su masa corporal no difiere entre sitios. En muestreos anteriores se han encontrado diferencias entre los sitios, aunque las mismas varían sin observarse un patrón fijo entre los diferentes muestreos. Se ha encontrado por ejemplo, que durante el muestreo de noviembre de 2015, diciembre de 2016 y diciembre de 2017, el IHS fue mayor en Nuevo Berlín, mientras que en abril de 2016 el IHS fue mayor en Fray Bentos; y en abril de 2017 fue mayor en Fray Bentos y Nuevo Berlín (sin diferencias entre ambos sitios) (Gonzalez-Bergonzoni *et al.*, 2015a, 2016a; López-Rodríguez *et al.*, 2016a, 2017a,b).

Por su parte, para el IGS (índice gónado-somático) sí se encontraron diferencias entre los sitios, siendo este parámetro significativamente mayor en Nuevo Berlín, que en los sitios receptores del efluente (Kruskal-Wallis: $\chi^2 = 12,03$; $p < 0,05$, Test *Post Hoc* Mann Whitney; Tabla 4-Apéndice 1).

El período reproductivo de esta especie comienza en agosto y se extiende hasta diciembre al norte de la cuenca del Río Paraná (de Santana *et al.*, 2016), y desde noviembre a diciembre en localidades ubicadas mas al sur (Holzbach *et al.*, 2009; Suzuki *et al.*, 2013). Esto podría explicar por lo tanto, valores de IGS e IHS mayores en los muestreos de primavera que de otoño (Tana, 2014; Gonzalez-Bergonzoni *et al.*, 2015b; López-Rodríguez *et al.*, 2016a, 2017a).

Al comparar la frecuencia de tallas de todos los individuos de *I. labrosus* colectados, observamos una dominancia de las tallas entre 6 y 12 cm. (Figura 10), y podemos observar que en este muestreo se han colectado muy escasos individuos de tallas superiores a 20 cm.

Por otra parte, al comparar la frecuencia de tallas entre sitios, observamos diferencias en las categorías de individuos entre 6,1-8 cm, entre 12,1-14 cm y entre 14,1-16cm. En este sentido, se

observa que existe un mayor número de individuos de la clase de tallas 6,1-8 cm en Fray Bentos y Las Cañas, que en Nuevo Berlín (ANOVA: $F = 19,81$; $p < 0,01$; diferencias entre sitios Test *post hoc* Tukey) (Fig. 10, Tabla 4). En lo que refiere a la clase de talla de individuos de entre 12,1 y 14 cm se encontró una menor abundancia relativa en Nuevo Berlín, intermedia en Fray Bentos y mayor en Las Cañas (ANOVA: $F = 6,87$; $p < 0,05$; diferencias entre sitios Test *post hoc* Tukey) (Fig. 10, Tabla 4). Finalmente, observamos una mayor abundancia de individuos comprendidos entre 12,1 y 15 cm en Nuevo Berlín y Fray Bentos que en Las Cañas (K-W: $\chi^2 = 8,02$; $p < 0.05$; diferencias entre sitios Test *post hoc* Mann Whitney) (Fig. 10; Tabla 4).




Figura 10. Distribución de abundancia de clases de talla de individuos de *I. labrosus* en las tres zonas de estudio en el período de abril de 2018. En verde: área referencia de Nuevo Berlín; en azul: área receptora inmediata de Fray Bentos; en rojo: área receptora lejana en Las Cañas. Las letras sobre las barras indican las diferencias obtenidas mediante Test *Post Hoc*.

Tabla 3. Indicadores de estado de condición de *I. labrosus* en la zona referencia (Nuevo Berlín), zona receptora inmediata (Fray Bentos) y zona receptora lejana (Las Cañas). Los datos se muestran como promedio y desvío estándar del factor de condición (FC), índice hepato-somático (IHS) e índice gónado-somático (IGS) de hembras de las clases de tamaño mayores a 13 cm de longitud estándar. Con * se indica el sitio y el índice para el cual se detectaron diferencias significativas ($p < 0,05$).

	Nuevo Berlín	Fray Bentos	Las Cañas
FC	1,29 $\pm$ 0,15	1,29 $\pm$ 0,09	1,30 $\pm$ 0,13
IHS	0,61 $\pm$ 0,12	0,64 $\pm$ 0,11	0,64 $\pm$ 0,13
IGS	0,55 $\pm$ 0,25 *	0,47 $\pm$ 0,14	0,46 $\pm$ 0,13

Tabla 4. Valores de tests estadísticos ANOVA y Kruskal Wallis ($\alpha = 0,05$) realizados para comparar abundancia de individuos en cada clase de tallas de la especie indicadora *I. labrosus* entre los tres sitios de muestreo. Se detalla cada parámetro comparado y se reporta el valor p y el estadístico F o del test realizado. Los resultados que son estadísticamente significativos se encuentran resaltados en negrita y resumidos. N.T. = No testeado por falta de réplicas.

Parámetro	Datos analizados	Áreas Estadístico	p- valor	Test estadístico utilizado	Resumen de diferencias
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 4<x<6	abr-18	F=0,93	0,43	ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	Sin diferencias entre sitios
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 6.1<x<8	abr-18	F= 19,81	0,0005	ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	Menor abundancia de esta talla en Nuevo Berlín
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 8.1<x<10	abr-18	F= 0,208	0,816	ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	Sin diferencias entre sitios
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 10.1<x<12	abr-18	F= 2,42	0,3	ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	Sin diferencias entre sitios
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 12.1<x<14	abr-18	F= 6,87	0,02	ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	Mayor en Las Cañas, intermedio en Fray Bentos y menor en Nuevo Berlín
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 14.1<x<16	abr-18	Chi2=8,02	0,02	Kruskall Wallis + Test Post Hoc Mann Whitney	Siempre menor en Las Cañas
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 16.1<x<18	abr-18	F= 2,82	0,13	ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	Sin diferencias entre sitios
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 18.1<x<20	abr-18	F= 1,94	0,22	ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	Sin diferencias entre sitios
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 20.1<x<22	abr-18	Chi2=1,3	0,52	Kruskall Wallis + Test Post Hoc Mann Whitney	Sin diferencias entre sitios
Clases de tallas <i>I. labrosus</i> 22.1<x<24	abr-18	N.T	N.T	-	-

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente monitoreo de la comunidad de peces correspondiente a abril de 2018 sugiere que no existe una disminución en número de especies, biomasa o abundancia de peces en la zona receptora inmediata de efluentes con respecto a la zona de referencia luego de la puesta en marcha de UPM S.A. El número de especies no mostró diferencias significativas entre los sitios de estudio. Por su parte, la abundancia fue menor en la zona receptora lejana, no encontrándose diferencias entre la zona receptora cercana y la zona de referencia. Finalmente, la biomasa fue menor en la zona receptora lejana que en la zona receptora cercana.

A lo largo de los estudios de línea de base y monitoreos ambientales previos (2005-2018) los parámetros de la estructura comunitaria estudiados no han cambiado en las zonas receptoras del efluente. La riqueza específica de peces ha sido siempre menor en la zona receptora lejana, Las Cañas, probablemente debido a diferentes condiciones ambientales naturales. Por otra parte, mayores valores de riqueza específica han sido observados durante los monitoreos posteriores a la puesta en marcha de la planta de UPM S.A. en los tres sitios de estudio por igual. Esto puede deberse simplemente a que al haber mayor número de instancias de muestreo desde la instalación de la planta, haya sido posible la captura de un mayor número de especies. Además, desde los primeros estudios de línea de base, la abundancia de peces siempre ha sido mayor en la zona de referencia y en la zona receptora inmediata que en la zona receptora lejana, y eso no ha cambiado luego de la puesta en marcha de la planta, período en el cual se han registrado incluso los mayores valores de abundancias en los tres sitios de estudio. Algo similar ocurre con la biomasa de peces, siendo siempre superior en la zona receptora inmediata (junto con Nuevo Berlín en el período pre-UPM) y la menor en el área receptora lejana (localidad de Las Cañas). Este patrón de diferentes biomásas en los tres sitios se ha mantenido inalterado luego de la puesta en funcionamiento de UPM S.A. a lo largo de todos los períodos de muestreo (e.g. González-Bergonzoni *et al.*, 2015a, 2016a, López-Rodríguez *et al.*, 2016a, 2017a,b).

Las mayores abundancias y biomásas de peces hacia la zona receptora cercana (Fray Bentos), tanto durante todo el período, como durante el presente estudio, son probablemente debido a que las características ambientales encontradas en dicha zona favorecen el mantenimiento de tales características en la comunidad de peces. Por ejemplo, el ambiente físico de la bahía y Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

desembocadura del arroyo Yaguararé podría proporcionar recursos alimenticios y refugio particularmente a varias especies de peces, tanto en su fase adulta, como en sus estadios juveniles. Esto coincide con lo hallado en monitoreos de zoobentos, uno de los principales recursos alimenticios para los peces, donde las mayores abundancias y densidades de invertebrados son halladas en la zona de Fray Bentos (e.g. LATU, 2014). Además, esta zona es la que presenta el mayor contenido de materia orgánica en sedimento lo cual podría explicar las altas densidades de zoobentos y eventualmente representa una mayor oferta alimenticia para las especies de peces que explotan este recurso (iliófagas).

Considerando la escala temporal, han existido picos de captura (i.e. aumentos en las CPUE en abundancia y biomasa), por ejemplo durante abril del año 2010, los cuales luego disminuyeron levemente hasta valores cercanos a los hallados durante el estudio de línea de base.

La estructura de la comunidad de peces, en términos de riqueza y composición específica, se ha mantenido relativamente estable con las mismas 10 a 20 especies dominantes, estando presentes en la gran mayoría de los muestreos (e.g. frecuencia de ocurrencia pre y post-UPM >80%, Apéndice 3) y presentando leves variaciones en dominancia de una u otra especie en determinados momentos, posiblemente generados por factores ambientales o asociado a patrones migratorios de las diferentes especies (e.g. como se viene observando en general en las especies *Parapimelodus valenciennis* y *Acestrorhynchus pantaneiro*) aunque estas variaciones no estén analizadas estadísticamente al detalle.

El único indicador de condición de la especie centinela seleccionada, *I. labrosus* que mostró diferencias entre los sitios fue el IGS. Por otra parte, suelen encontrarse algunas diferencias en los índices gonado- y hepato-somático entre zonas durante algunos muestreos particularmente en diciembre, momento previo al período reproductivo (Suzuki *et al.*, 2013).

Durante monitoreos de exposición previos (2005- diciembre 2017), no se han encontrado valores de concentración de sustancias cloro-fenólicas, fito-esteroles o ácidos resínicos en bilis que sugieran un impacto de la planta de UPM S.A., y pudieran repercutir en indicadores de condición (e.g. IGS o IHS). Lo mismo sucedió con las concentraciones de Dioxinas y PCBs en Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

músculo de esta especie (López-Rodríguez *et al.*, 2017c), siendo estos valores siempre bajos y estando por debajo de los límites máximos recomendados por organizaciones gubernamentales internacionales (Health-Canada, 2010).

Los resultados que se obtuvieron en este estudio sugieren que no existiría un impacto apreciable en la diversidad, abundancia y biomasa de la comunidad de peces en las zonas que reciben efluentes provenientes de la planta de UPM S.A., en Fray Bentos. No existen antecedentes de efectos negativos de efluentes de plantas de celulosa que usen la tecnología BAT sobre la comunidad de peces (EEM, 2010), y el presente monitoreo no representa una excepción.

Los programas de biomonitoreo se realizan con el fin de evaluar periódicamente potenciales efectos nocivos y en caso de ser percibidos plantear estrategias para mitigarlos, informando sobre posibles efectos adversos e impactos para el ecosistema y la salud humana. En este sentido, el presente programa cumple con esa demanda desde su inicio con los estudios de línea de base en Abril de 2005, proveyendo información esencial para el diagnóstico ambiental del río Uruguay bajo en la zona de estudio. La obtención de nuevos datos posibilitará un estudio más detallado para evaluar cuáles son los factores ambientales que naturalmente ocasionan variaciones en la composición de la comunidad de peces en esta zona del río Uruguay. Continuar con el monitoreo bi-anual permitirá conocer con mayor fidelidad las fluctuaciones en la riqueza, abundancia y biomasa de peces encontradas a lo largo de los años. Esto permitirá en cada vez poder ser más precisos en detectar un potencial impacto ambiental sobre la estructura de la comunidad de peces, al observar variaciones que se aparten de lo esperable dadas las condiciones ambientales naturales del río Uruguay. Este programa de biomonitoreo ha demostrado ser altamente adecuado y viable para ser llevado ante la implantación de nuevos y similares emprendimientos industriales en grandes ríos de nuestro país.

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anon 2001. European Commission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC): Reference document on Best Available Techniques in the pulp and paper industry. December 2001.
- Calvelo J., D'Anatro A., Vidal N., Teixeira de Mello F. & González-Bergonzoni I. 2013. Análisis de la estructura poblacional del bagre trompudo, *Iheringichthys labrosus* Lütken 1874 (Siluriformes: Pimelodidae), en la cuenca baja del Río Uruguay. Informe Técnico, 13 pp.
- CELA 2006. Establecimiento de una línea de base de las comunidades de fitoplancton, zooplancton y bentos en el Río Uruguay (desde Nuevo Berlín a Las Cañas) Rio Negro – Uruguay. CELA report marzo 2006, Montevideo, Uruguay.
- D'Anatro, A., Vidal, N., González-Bergonzoni, I., Teixeira de Mello, F., Tana, J., Naya, D. 2013. Geographic and sasonal variation analysis of digestive morphology in the catfish *Iheringichthys labrosus* along lower Rio Uruguay. Open access animal physiology, 5:9-13.
- de Santana H. S., Rodrigues A. C. & Dei Tos C., 2016. Patterns of reproduction and growth of the catfish *Iheringichthys labrosus* (Lutken, 1874) after a reservoir formation. *J. Appl. Ichthyol*, 1, 8.
- EEM, C., 2010. Pulp and Paper environmental effects monitoring (EEM) technical guidance document. Environment Canada, 26.
- Froese, R., 2006. Cube law, condition factor and weight–length relationships: history, meta-analysis and recommendations. *Journal of Applied Ichthyology*, 22:241–253.
- González-Bergonzoni, I., A. D'Anatro, S. Stebniki & F. Teixeira de Mello, 2015. Estructura comunitaria y diversidad de peces en el Río Uruguay: monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A, Noviembre 2015. UPM S.A, Fray Bentos, Uruguay: 29p.
- González-Bergonzoni, I., A. D'Anatro, S. Stebniki; Vidal, N & F. Teixeira de Mello, 2016a. Estructura comunitaria y diversidad de peces en el Río Uruguay: monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A, Abril 2016. UPM S.A, Fray Bentos, Uruguay: 45p.
- Heath-Canada, 2010. Current canadian objectives, guildelines and regulations (en línea). . Health Canada, Ottawa, Canada.

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

- Holzbach A. J., Gubiani É. A. & Baumgartner G.. 2009. *Iheringichthys labrosus* (Siluriformes: Pimelodidae) in the Piquiri River, Paraná, Brazil: population structure and some aspects of its reproductive biology. *Neotropical Ichthyology*, 7: 55-64.
- Masdeu M., Teixeira de Mello, F., Loureiro M. & Arim M. 2011. Feeding habits and morphometry of *Iheringichthys labrosus* (Lütken, 1874) in the Uruguay River (Uruguay). *Neotropical Ichthyology*, 9, 657-664.
- Magurran, A. E. 1988. Ecological Diversity and its Measurement. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Labotatorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 2014. Informe de ensayo No1418554, Muestreo biológico. Agosto 2014. Montevideo, Uruguay 22p.
- Litz, T.O. & S. Koerber, 2014: Check List of the Freshwater Fishes of Uruguay (CLOFFUY). *Ichthyological Contributions of Peces Criollos* 28: 1-40.
- López-Rodríguez, A., González-Bergonzoni, I., A. D'Anatro, S. Stebniki, Vidal, N. & F. Teixeira de Mello, 2016a. Estructura comunitaria y diversidad de peces en el Río Uruguay: monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A, Diciembre 2016. UPM S.A, Fray Bentos, Uruguay: 45p.
- López-Rodríguez, A., González-Bergonzoni, I., S. Stebniki, Vidal, N., Teixeira de Mello, F. & A. D'Anatro, 2017a. Estructura comunitaria y diversidad de peces en el Río Uruguay: monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A, Abril 2017. UPM S.A, Fray Bentos, Uruguay: 48p.
- López-Rodríguez, A., González-Bergonzoni, I., S. Stebniki, Vidal, N., Teixeira de Mello, F. & A. D'Anatro, 2017b. Estructura comunitaria y diversidad de peces en el Río Uruguay: monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A, diciembre 2017. UPM S.A, Fray Bentos, Uruguay: 50p
- López-Rodríguez, A; González-Bergonzoni, I., Stebniki, S., Vidal, N., Teixeira de Mello, F. & A. D'Anatro, 2017c. Monitoreo de exposición: monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A, diciembre 2017. UPM S.A, Fray Bentos, Uruguay. 76 pp.
- López-Rodríguez, A; González-Bergonzoni, I., Stebniki, S., Vidal, N., Teixeira de Mello, F. & A. D'Anatro, 2018. Monitoreo de exposición: monitoreo en la zona receptora de efluentes de la
- Anahí López-Rodríguez ², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

- planta de pasta de celulosa UPM S.A, Abril 2018. UPM S.A, Fray Bentos, Uruguay: *en preparación*.
- Oldani N. O. 1990 Variaciones de la abundancia de peces del valle del río Paraná (Argentina) Rev. Hydrobiol. Trop. 23 (1): 67-76.
- Stassen, M. J. M., M. W. P. M. van de Ven, T. van der Heide, M. A. G. Hiza, G. van der Velde, & A. J. P. Smolders. 2010. Population dynamics of the migratory fish *Prochilodus lineatus* in a Neotropical river: the relationships with river discharge, flood pulse, El Niño and fluvial megafan behaviour. Neotropical Ichthyology 8:113-122.
- Suzuki F. M., Garcia D. A. Z. & Orsi M. L., 2013. Reproductive Dynamics of *Iheringichthys labrosus* (Lütken, 1874)(Teleostei, Pimelodidae), in the Capivara Reservoir, Paranapanema River, Parana, Brazil. *Dataset Papers in Science*, 2013.
- Tana, J., 2007. Studies on fish community and species diversity in Rio Uruguay prior to the planned Botnia pulp mill. Fifth test fishing period, April 2007. ÅF-Enprima report, June 2007, Vantaa, Finland.
- Tana, J., 2012. Fish community and species diversity in Rio Uruguay. Monitoring studies in the recipient of Botnia pulp mill, April 2012. ÅF-Consult report, ENVIR-275. June 2012.
- Tana, J., 2013. Fish community and species diversity in Rio Uruguay. Monitoring studies in the recipient of Botnia pulp mill, December 2012. ÅF-Consult report, ENVIR-454. February 2013.
- Tana J., 2014. Fish community and species diversity in Rio Uruguay. Monitoring studies in the recipient of Botnia pulp mill, April 2014. ÅF-Consult report. June 2014.
- Teixeira de Mello, F., I. González-Bergonzoni & M. Loureiro, 2011. Peces de agua dulce del Uruguay. , Montevideo, Uruguay.
- Underwood, A., 1991. Beyond BACI: Experimental designs for detecting human environmental impacts on temporal variations in natural populations. Marine and Freshwater Research 42(5):569-587.
- Vazzoler, A. E. A. de M. 1996. Biología da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática. Maringá, EDUEM. 169p
- Wootton R.J. 1991. Ecology of teleost fishes., Chapman and Hall, London.

APÉNDICE 1

Tabla 1. Valores de tests estadísticos ANOVA ($\alpha = 0,05$) realizados para comparar abundancias biomásas y riqueza específica de la comunidad de peces e indicadores de condición en la especie indicadora *I. labrosus*. Se detalla cada parámetro comparado y se reporta el valor p, el estadístico F o χ^2 y los grados de libertad de los residuos (g.l res) del test realizado, los resultados que son estadísticamente significativos se encuentran resaltados en negrita y resumidos, los resultados marginalmente significativos se observan en cursiva.

Parámetro	Datos analizados	Período		Áreas		Interacción periodo- área			Semanas de muestreo		Habitats muestreados		Test estadístico utilizado	Resumen de diferencias
		Estadístico	p-valor	Estadístico	p-valor	Estadístico	p-valor	g.l res						
Biomasa de peces CPUE	Periodo de estudio (2005-2018)	F=0,12	0,73	F=65,2	2 X10 ⁻¹⁶	F=3,27	0,04	571					ANOVA factorial de 2 vías + Test Post Hoc-Tukey HSD	Menor en Las Cañas, intermedia en Nuevo Berlín y máxima en Fray Bentos
Abundancia de Peces CPUE	Periodo de estudio (2005-2018)	F= 0,61	0,44	F=4,495	2 X10 ⁻¹⁶	F=4,18	0,02	571					ANOVA factorial de 2 vías + Test Post Hoc-Tukey HSD	Menor en Las Cañas, intermedia en Nuevo Berlín y máxima en Fray Bentos
Número de especies CPUE	Periodo de estudio (2005-2018)	Chi2=5,39	0,02	Chi2=58,51	1,97 X10 ⁻¹³								Kruskall Wallis + Test Post Hoc Mann Whitney	Mayor en el periodo post-UPM y siempre menor en Las Cañas
Biomasa de peces	abr-18			F=4,23	0,03								ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	Menor en Las Cañas que en Fray Bentos
Abundancia de peces	abr-18			Chi2=8,02	0,02								Kruskall Wallis + Test Post Hoc Mann Whitney	Siempre menor en Las Cañas
Número de especies	abr-18			F=11,48	0,25								ANOVA de 1 vía/Test Post Hoc-Tukey HSD	No hay diferencia entre sitios
Área A--Biomasa de peces	Abril-2018-Nuevo Berlín								F=8,55	0,03	F=5,27	0,07	ANOVA de 2 vías	Mayor biomasa en segunda semana
Área A--Abundancia de peces	Abril-2018-Nuevo Berlín								F=1,72	0,25	F=4,42	0,09	ANOVA de 2 vías	<i>Tendencia a mayor abundancia en segunda semana</i>
Área A--Número de especies	Abril-2018-Nuevo Berlín								Chi2=0,35	0,55	Chi2=4,34	0,04	Kruskall Wallis + Test Post Hoc Mann Whitney	Mayor riqueza de especies en zona litoral
Área B--Biomasa de peces	Abril-2018-Fray Bentos								F= 1,225	0,31	F=0,01	0,98	ANOVA de 2 vías	No hay diferencias entre semanas de muestreo o habitats
Área B--Abundancia de Peces	Abril-2018-Fray Bentos								F= 1,73	0,23	F=0,57	0,48	ANOVA de 2 vías	No hay diferencias entre semanas de muestreo o habitats
Área B--Numero de especies	Abril-2018-Fray Bentos								F=0,385	0,56	F=385	0,56	ANOVA de 2 vías	No hay diferencias entre semanas de muestreo o habitats
Área C--Biomasa de peces	Abril-2018-Las Cañas								F= 7,55	0,04	F=8,06	0,04	ANOVA de 2 vías	Mayor biomasa en zona litoral y en la segunda semana
Área C--Abundancia de Peces	Abril-2018-Las Cañas								F=3,93	0,1	F=3,63	0,12	ANOVA de 2 vías	No hay diferencias entre semanas de muestreo o habitats
Área C--Numero de especies	Abril-2018-Las Cañas								F=3,34	0,13	F=17,27	0,009	ANOVA de 2 vías	Mayor riqueza de especies en zona litoral

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

FC-Especie indicadora <i>I. labrosus</i>	abr-18	Chi2=0,027	0,99					Kruskall Wallis + Test Post Hoc Mann Whitney	No hay diferencias en FC entre sitios
IHS-Especie indicadora <i>I. labrosus</i>	abr-18	F=0,60	0,55					ANOVA de 2 vías	No hay diferencias en IHS entre sitios
GSI-Especie indicadora <i>I. labrosus</i>	abr-18	Chi2=12,03	0,002					Kruskall Wallis + Test Post Hoc Mann Whitney	Mayor IGS en Nuevo Berlín

Anahí López-Rodríguez ², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

APÉNDICE 2

Tabla 2. Listado de especies de peces colectadas durante todos los períodos de monitoreo de la comunidad de peces.

Clasificación taxonómica de los peces colectados			
Orden	Familia	Especie	Nombre común
Characiformes	Anostomidae	<i>Leporinus lacustris</i>	Boga
		<i>Megaleporinus obtusidens</i>	Boga; Bogón
		<i>Leporinus striatus</i>	Trompa roja
		<i>Leporellus pictus</i>	Boga rayada
		<i>Schizodon borelli</i>	Boga lisa
		<i>Schizodon nasutus</i>	Boga
		<i>Schizodon platae</i>	Boga lisa
		<i>Acestrorhynchus pantaneiro</i>	Dientudo paraguayo
	Characidae	<i>Astyanax abramis</i>	Mojarra
		<i>Astyanax spp</i>	Mojarra
		<i>Brycon orbignyanus</i>	Salmon
		<i>Bryconamericus iheringii</i>	Mojarra
		<i>Bryconamericus stramineus</i>	Mojarra
		<i>Charax stenopterus</i>	Mojarra transparente
		<i>Cheirodon interruptus</i>	Mojarra
		<i>Cynopotamus argenteus</i>	Dientudo jorobado
		<i>Galeocharax humeralis</i>	Dientudo jorobado
		<i>Hyphessobrycon meridionalis</i>	Mojarra
		<i>Odontostilbe pequirá</i>	Mojarra
		<i>Oligosarcus jenynsi</i>	Dientudo
		<i>Oligosarcus oligolepis</i>	Dientudo
		<i>Pygocentrus nattereri</i>	Piraña Negra
		<i>Raphiodon vulpinus</i>	Chafalote
		<i>Roeboides bonariensis</i>	Dientudo jorobado
		<i>Roeboides affinis</i>	Dientudo jorobado
		<i>Salminus maxillosus</i>	Dorado
		<i>Serrasalmus marginatus</i>	Piraña, Palometa amarilla
		<i>Serrasalmus maculatus</i>	Piraña, Palometa
		<i>Triportheus paramensis</i>	Mojarra

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

Continuación de Tabla 1			
Orden	Familia	Especie	Nombre común
	<i>Crenuchidae</i>	<i>Characidium rachovii</i>	Tritolo
		<i>Characidium tenue</i>	Tritolo
		<i>Characidium zebra</i>	Tritolo
	<i>Curimatidae</i>	<i>Cyphocharax platanus</i>	Sabalito plateado
		<i>Cyphocharax saladensis</i>	Sabalito
		<i>Cyphocharax spilatus</i>	Sabalito
		<i>Cyphocharax voga</i>	Sabalito
		<i>Steindachnerina brevipinna</i>	Sabalito
	<i>Erithrinidae</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>	Tararira
	<i>Parodontidae</i>	<i>Apareiodon affinis</i>	Violito, Virolo
	<i>Prochilodontidae</i>	<i>Prochilodus lineatus</i>	Sábalo
Siluriformes	<i>Aspredinidae</i>	<i>Bunocephalus coracoideus</i>	Guitarrita
		<i>Pseudobunocephalus iheringii</i>	Guitarrita
	<i>Auchenipteridae</i>	<i>Ageineiosus inermis</i>	Mandubá
		<i>Ageineiosus militaris</i>	Manduví
		<i>Auchenipterus nuchalis</i>	Buzo
		<i>Auchenipterus osteomystax</i>	Buzo
		<i>Trachelypterus galeatus</i>	Torito
		<i>Trachelypterus teaguei</i>	Torito
	<i>Callichthyidae</i>	<i>Callichthys callichthys</i>	Cascarudo
		<i>Hoplosternum litorale</i>	Cascarudo
		<i>Corydoras paleatus</i>	Limpia fondo
	<i>Doradidae</i>	<i>Pterodoras granulosus</i>	Armado común
		<i>Rhinodoras dorbignyi</i>	Armado marieta
	<i>Heptapteridae</i>	<i>Rhamdia quelen</i>	Bagre sapo/negro
	<i>Loricariidae</i>	<i>Brochiloricaria sp.</i>	Vieja de agua
		<i>Hisonotus sp.</i>	
		<i>Hypostomus alatus</i>	Vieja
		<i>Hypostomus commersonii</i>	Vieja de agua
		<i>Hypostomus aspilogaster</i>	Vieja del Vieja
		<i>Hypostomus luteomaculatus</i>	Vieja de agua
		<i>Hypostomus laplatae</i>	Vieja del agua
		<i>Loricarichthys anus</i>	Vieja de agua
		<i>Rineloricaria parva</i>	Vieja de agua

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

		<i>Loricariichthys edentatus</i>	Vieja de agua
		<i>Loricariichthys platymetopon</i>	Vieja de agua
Continuación de Tabla 1			
Orden	Familia	Especie	Nombre común
		<i>Loricariichthys melanochelius</i>	Vieja de agua
		<i>Otocinclus flexilis</i>	Limpiavidrios
		<i>Pseudohemiodon sp.</i>	Vieja de agua
		<i>Paraloricaria vetula</i>	Vieja de cola
		<i>Rhinelepis aspera</i>	Vieja de agua
		<i>Ricola macrops</i>	Vieja de agua
		<i>Rinelocaria sp.</i>	Vieja de agua
	<i>Pimelodidae</i>	<i>Iheringichthys labrosus</i>	Bagre trompudo
		<i>Luciopimelodus pati</i>	Patí
		<i>Parapimelodus valenciennis</i>	Bagarito
		<i>Pimelodus absconditus</i>	Bagre blanco
		<i>Pimelodella australis</i>	Bagre
		<i>Pimelodella gracilis</i>	Bagre cantor
		<i>Pimelodus maculatus</i>	Bagre amarillo
		<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	Surubi
		<i>Sorubim lima</i>	Cucharón
	<i>Pseudopimelodidae</i>	<i>Pseudopimelodus mangurus</i>	Manguruyú
		<i>Microglanis sp.</i>	Manguruyú
	<i>Trichomcteridae</i>	<i>Homodietus sp.</i>	Sanguijuela
		<i>Parastegophilis sp.</i>	Chupa-chupa
Perciformes	<i>Cichlidae</i>	<i>Crenicichla minuano</i>	Cabeza amarga
		<i>Crenicichla misionera</i>	Cabeza amarga
		<i>Crenicichla scottii</i>	Cabeza amarga
		<i>Crenicichla sp.</i>	Cabeza amarga
		<i>Crenicichla vittata</i>	Cabeza amarga
		<i>Gymnogeophagus australis</i>	Castañeta
	<i>Scianidae</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>	Corvina de río
Gymnotiformes	<i>Sternopygidae</i>	<i>Eigenmania trilineata</i>	Banderita
		<i>Eigenmania virescens</i>	Banderita ratona
	<i>Gymnotidae</i>	<i>Gymnotus sp.</i>	Morena
	<i>Hypopomidae</i>	<i>Brachyhypopomus sp.</i>	Morena
Clupeiformes	<i>Clupeidae</i>	<i>Lycengraulis grossidens</i>	Anchoa de río

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

		<i>Pellona flavipinnis</i>	Lacha
		<i>Platanichthys platana</i>	Sardina
Continuación de Tabla 1			
Orden	Familia	Especie	Nombre común
		<i>Ramnogaster melanostoma</i>	Mandufia
Atheriniformes	<i>Atherinopsidae</i>	<i>Odontesthes humensis</i>	Pejerrey
		<i>Odontesthes perugiae</i>	Pejerrey juncalero
Synbranchiformes	<i>Synbranchidae</i>	<i>Synbranchus marmoratus</i>	Anquilla
Pleuronectiformes	<i>Achiridae</i>	<i>Catathyridium jenynsi</i>	Lenguado de río
Rajiformes	<i>Potamotrigonidae</i>	<i>Potamotrygon brachyurus</i>	Raya de río

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

APÉNDICE 3.

Tabla 3. Abundancia total colectada y frecuencia de ocurrencia de cada especie colectada durante el período de estudio 2005-2018. Se muestra la abundancia total colectada por año desglosada en el muestreo estacional: otoño (O) y primavera (P) de cada año. La frecuencia de ocurrencia representa el % de los muestreos en los que cada especie se colectó y se desglosa en todo el período (Total), el período de línea de base (Pre-UPM) y monitoreos posteriores a la puesta en marcha de UPM S.A. (Post UPM). Las especies presentes en más del 90% de los muestreos se marcan en negrita y aquellas únicamente presentes en un muestreo, en cursiva. Las especies más frecuentes en los muestreos pre-UPM (F.O. > 90%) siguen siendo las más frecuentes en los monitoreos Post-UPM.

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	TOTAL	Pre-UPM	Post-UPM
Especies	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	P	O	F.O. (%)	F.O. (%)	F.O. (%)
<i>Astyanax sp.</i>	67	127	46	90	194	635	1521	1131	395	1	249	1074	1124	977	835	1177	290	307	219	990	368	286	55	582	301	779	437	100.00	100.00	100.00
<i>Cynopotamus argenteus</i>	149	23	10	4	109	38	106	49	121	11	125	3	112	12	72	17	77	5	124	62	102	17	67	41	160	197	233	100.00	100.00	100.00
<i>Iheringichthys labrosus</i>	559	687	364	1982	1830	1443	1535	1654	1416	965	580	877	1008	730	1129	828	804	796	462	419	1077	571	352	565	610	590	1327	100.00	100.00	100.00
<i>Lycengraulis grossidens</i>	27	40	23	19	315	85	168	137	415	187	68	1	729	181	516	496	300	202	169	260	421	288	83	26	121	71	273	100.00	100.00	100.00
<i>Pachyrurus bonariensis</i>	109	215	130	297	379	206	296	257	295	460	55	49	258	78	316	269	193	427	160	100	195	241	162	89	311	85	196	100.00	100.00	100.00
<i>Paraloricaria vetula</i>	45	35	16	95	104	30	50	55	91	132	27	9	62	20	17	22	34	31	36	17	19	22	86	15	22	4	25	100.00	100.00	100.00
<i>Parapimelodus valenciennes</i>	30	258	19	523	265	1535	562	1746	287	1425	331	290	165	341	165	443	67	217	35	381	49	1024	116	491	107	290	212	100.00	100.00	100.00
<i>Prochilodus lineatus</i>	1	15	2	2	1	25	12	24	4	6	664	260	63	61	9	11	14	7	16	3	78	1	14	276	30	55	57	100.00	100.00	100.00
<i>Apareiodon affinis</i>	161	78	83	121	159	328	391	793	1585		215	33	648	304	297	170	75	70	189	348	361	93	5	87	16	270	120	96.30	100.00	95.45
<i>Loricariichthys melanocheilus</i>	10	16	155	216	132	103	136	76	295	77	64	37	86	48	128	29	124	17	63	65	208	80	85	34	83	98	96.30	80.00	100.00	
<i>Megaleporinus obtusidens</i>	72	35	24	6	31	176	70	61	55		171	370	155	144	87	83	36	40	39	38	59	27	7	330	143	219	82	96.30	100.00	95.45
<i>Pimelodella gracilis</i>		13	5	24	112	96	160	251	341	52	653	71	75	107	48	22	140	23	56	44	135	99	68	190	108	163	153	96.30	80.00	100.00
<i>Astyanax abramis</i>	34	51	6	7		48	65	234	18		151	26	10	11	9	12	4	1	13	35	65	13	4	83	8	46	33	92.59	80.00	95.45

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

<i>Luciopimelodus pati</i>	4	3	1	4	8	9	8	6	13	15	41	3	10		5	9	1	2	7	2	5	6	2	1	5	4	92.59	100.00	90.91	
<i>Hypostomus commersoni</i>		6	7	21	6	1	10	7	5		8	10	3	6	1	3	2	6	9	2		1	2	3	1	1	5	88.89	80.00	90.91
<i>Pellona flavipinnis</i>	6	22	3		23		8	16	5	6		2	6	1	7	34	25	10	8	29	21	21	10	1	1	9	13	88.89	80.00	90.91
<i>Cyphocharax platanus</i>		17		73	4		91	204	22		125	592	892	573	288	320	82	68	33	39	76	41	67	412	184	182	62	85.19	60.00	90.91
<i>Ricola macrops</i>				57		61	29	60	116	278	76	4	62	33	17	19	20	30	3	18	5	28	149	12	47	25	19	85.19	20.00	100.00
<i>Acestrorhynchus pantaneiro</i>	30	19	4		8	2	2	3	3		297	1	3	29		4			9	15	137	7	48	130	15	28	20	81.48	80.00	81.82
<i>Bryconamericus stramineus</i>				168	84	73	80	318	88	4	48		686	667	216	316	71	28	21	91	24	10		29	2	231	82	81.48	40.00	90.91
<i>Catathyrindium jenynsii</i>	4	1	1	2	3	1	5		2	2	1		1	1	1	2		2		1	1	1	2		1	2	2	81.48	100.00	77.27
<i>Loricariichthys edentatus</i>				31	40	56	27	23	23	207	37	6	5	4	2	23	10	23	3	5	1	3		7		6	1	81.48	40.00	90.91
<i>Salminus brasiliensis</i>	5	5	3		1	3	4	48	10	3	91	13	16	7	3		4		5	3	10	1		2	2		2	81.48	80.00	81.82
<i>Serrasalmus maculatus</i>	4	2		1	8	1	1	4	1		139	56	20	13	3	6	1				18	1	4	34	1	20	8	81.48	80.00	81.82
<i>Auchenipterus nuchalis</i>	2	15	1	1	1		2	4	21		1		11	1	18	4	4		3	1	36	4	9			21	4	77.78	100.00	72.73
<i>Eigenmannia virescens</i>	1	4		2	4	2	2	3	2	1	2			9	1	9		3		5	2	4	2	7	1	1		77.78	80.00	77.27
<i>Leporinus striatus</i>				3	62	12	2	15	28	1	76	4	2	4	7		11	8	3	5	41	10	2	8		3		77.78	40.00	86.36
<i>Ageneiosus militaris</i>		4		1	2	5		3	1		22	3	2				1	5	4	13	2	15	46	5	20	3	5	74.07	60.00	77.27
<i>Odontostilbe pequirá</i>					100	11	20		2	6	62	16	209		113	4	109	9	195	167	157	1	264	2	190	3		74.07	0.00	90.91
<i>Cyphocharax spilotos</i>				5	3	44	14	4	10		10	80	35	1		1		1		9	1	32	13	39		2	4	70.37	40.00	77.27
<i>Rhaphiodon vulpinus</i>	4	1	1		19	1	9		19		43		20		15		13		17	1	19		11	3	3	3	12	70.37	80.00	68.18
<i>Steindachnerina brevipinna</i>		106	50	13	4		1	1			13	2					1		1	5	21	14	10	44	3	4	19	66.67	80.00	63.64
<i>Hoplias malabaricus</i>	1		3		1	2	1		1		10	3	3	2	2				3		2		2		3	2	7	62.96	60.00	63.64
<i>Odontesthes humensis</i>		1						20	24		4	2	3	59	35	26	2		1	1		2		5	1	1	1	62.96	20.00	72.73
<i>Crenicichla missionera</i>				3	6	8	12	23	14			2	2	12	10	10			2	1	4					2	2	59.26	40.00	63.64
<i>Loricariichthys anus</i>		51						1	1	3		1		2	1	3		5	3	4		3		2	2	2	3	59.26	20.00	68.18
<i>Pimelodus maculatus</i>				8								86	3		14	10	7	5	12	7	7	16	70	40	5	6	9	59.26	20.00	68.18

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Abril, 2018

Anahí López-Rodríguez ², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Matajojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

<i>Characidium sp.</i>			1	17		1	2			1	6							22.22	20.00	22.73
<i>Loricariinae sp.</i>	35									1			1	2	1	16		22.22	20.00	22.73
<i>Pimelodella australis</i>												47	3	5	9	1	6	22.22	0.00	27.27
<i>Schizodon borelli</i>	3								4	3	5	1			1			22.22	20.00	22.73
<i>Auchenipterus osteomystax</i>													1	1		4	10	18.52	0.00	22.73
<i>Brochiloricaria sp.</i>			2	30										1	1		2	18.52	20.00	18.18
<i>Bunocephalus sp.</i>			1	1					1		3				1			18.52	20.00	18.18
<i>Characidium zebra</i>									1		1		17	2		15		18.52	0.00	22.73
<i>Odontesthes bonariensis</i>			1	7	198	2			5									18.52	20.00	18.18
<i>Rhineloricaria sp.</i>				5		1	2	3	1									18.52	0.00	22.73
<i>Crenicichla sp.</i>	2	15		3	1													14.81	60.00	4.55
<i>Hypostomus alatus</i>	6		4	1					1									14.81	60.00	4.55
<i>Loricaria sp.</i>				6				1			1				1			14.81	0.00	18.18
<i>Otocinclus flexilis</i>									1						1	3	2	14.81	0.00	18.18
<i>Parastegophilus</i>														9	1	21	2	14.81	0.00	18.18
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i>								15	5	1	2							14.81	0.00	18.18
<i>Trachelyopterus teaguei</i>												3			4	1	2	14.81	0.00	18.18
<i>Bryconamericus sp.</i>											26		50	1				11.11	0.00	13.64
<i>Characidium tenue</i>													7		5		2	11.11	0.00	13.64
<i>Cheirodon interruptus</i>			16			1											5	11.11	20.00	9.09
<i>Gymnogeophagus australis</i>					2	13	8											11.11	0.00	13.64
<i>Gymnotus carapo</i>			2												1	1		11.11	20.00	9.09
<i>Hoplosternun littorale</i>													1		1	7		11.11	0.00	13.64
<i>Pterodoras granulosus</i>	2							20	1									11.11	20.00	9.09
<i>Reoboides bonariensis</i>											1				1	4		11.11	0.00	13.64

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

<i>Sorubim lima</i>				1			16							1				11.11	0.00	13.64
<i>Charax stenopterus</i>										1				1				7.41	0.00	9.09
<i>Crenichla scotti</i>									1					1				7.41	0.00	9.09
<i>Gymnotus sp.</i>			1					1										7.41	20.00	4.55
<i>Hyphessobrycon meridionalis</i>					1												2	7.41	0.00	9.09
<i>Hypostomus laplatanus</i>															1		2	7.41	0.00	9.09
<i>Hypostomus luteomaculatus</i>				2						1								7.41	20.00	4.55
<i>Hypostomus sp.</i>							1										1	7.41	0.00	9.09
<i>Microglanis</i>													1		1			7.41	0.00	9.09
<i>Pseudobunocephalus iheringii</i>												1	2					7.41	0.00	9.09
<i>Pseudohemiodon sp.</i>			3	1														7.41	40.00	0.00
<i>A. rutilus</i>																	51	3.70	0.00	4.55
<i>Astyanax fasciatus</i>																	2	3.70	0.00	4.55
<i>Brachyhypopomus sp.</i>												1						3.70	0.00	4.55
<i>Bunocephalus coracoides</i>																	1	3.70	0.00	4.55
<i>Callichthys callichthys</i>							6											3.70	0.00	4.55
<i>Characidium rachovii</i>													1					3.70	0.00	4.55
<i>Charax sp.</i>																	1	3.70	0.00	4.55
<i>Cheirontinae</i>																	1	3.70	0.00	4.55
<i>Corydoras paleatus</i>																	2	3.70	0.00	4.55
<i>Crenicichla lepidota</i>			3															3.70	20.00	0.00
<i>Cyphocharax saladensis</i>										1								3.70	0.00	4.55
<i>Eigenmannia trinileneata</i>														4				3.70	0.00	4.55
<i>H. laplatae</i>																	2	3.70	0.00	4.55
<i>H. roseopunctatus</i>																	1	3.70	0.00	4.55

Anahí López-Rodríguez ², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018

<i>Hisonotus sp.</i>		11				3.70	0.00	4.55
<i>Hypostomus derbyi</i>	1					3.70	0.00	4.55
<i>Hypostomus microstomus</i>				1		3.70	0.00	4.55
<i>Leporellus pictus</i>					1	3.70	0.00	4.55
<i>Leporinus lacustris</i>		2				3.70	0.00	4.55
<i>Loricarrichtys platymetopon</i>							1	3.70 0.00 4.55
<i>Odontesthes sp.</i>	3					3.70	20.00	0.00
<i>Otocinclus sp.</i>							5	3.70 0.00 4.55
<i>Pachyurus bonariensis</i>				1		3.70	0.00	4.55
<i>Paraloricaria vetula</i>				1		3.70	0.00	4.55
<i>Pseudohemiodon devincenzii</i>							1	3.70 0.00 4.55
<i>Pseudopimelodus mangurus</i>							1	3.70 0.00 4.55
<i>Pseudopimelodus mangurus</i>		1				3.70	0.00	4.55
<i>R. parva</i>							3	3.70 0.00 4.55
<i>Rhinelepis aspera</i>		1				3.70	0.00	4.55
<i>Rhoeboides affinis</i>							9	3.70 0.00 4.55
<i>Roeboides paranannus</i>							1	3.70 0.00 4.55
<i>Synbrachyus marmoratus</i>	1					3.70	0.00	4.55

APÉNDICE 4.

Anahí López-Rodríguez ², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy

Monitoreo en la zona receptora de efluentes de la planta de pasta de celulosa UPM S.A.

Abril, 2018




Figura 1. Variaciones estacionales de la abundancia de *P. Valenciennes* durante todo el programa de monitoreo (2005-abril 2018). Se puede observar comportamiento oscilatorio con disminuciones en otoño y aumento en primavera. O= Otoño; P= Primavera.

Anahí López-Rodríguez², Ivan González-Bergonzoni¹, Samanta Stebniki¹, Nicolás Vidal¹, Franco Teixeira de Mello² y Alejandro D'Anatro^{1*}

1-Laboratorio de Evolución y Sistemática, Facultad de Ciencias, Iguá 4225 Esq. Mataojo C.P. 11400 Montevideo; 2-CURE-Facultad de Ciencias; *e-mail: passer@fcien.edu.uy